

Evt. spørgsmål til sygeplejersken / lægen:

Hillerød Hospital
Anæstesiologisk Afd.
Dagkirurgisk afsnit 0162
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Telefon: 48 29 49 00
Træffetid: 09.00 - 12.00
14.00 - 15.00



Brok hos børn - juli 2010

REGION

Hillerød Hospital
Anæstesiologisk Afdeling
Dagkirurgisk afsnit 0162

Brok hos børn

(Hernie)

- Du skal møde på Dagkirurgisk Afsnit 0162 dato: _____
- Du bedes ringe **hverdagen inden** operationen, mellem kl. 13 og 14, på tlf.:48294905 og få oplyst mødetidspunkt.
- Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause fra dato: _____

Anæstesiologisk Afdeling - Hillerød Hospital

Bedøvelse

På operationsstuen lægges en lille slange (et drop) i en åre på håndryggen eller underarmen. Der bliver sat elektroder på brystet til kontrol af hjertet, og operationen foregår i fuld bedøvelse.

Får barnet kvalme efter bedøvelsen, kan der gives medicin for dette.

Operation

Gennem et lille snit i lysken eller navlen, fjernes den medfødte udposning af bughinden. Indgrebet er kortvarigt, og gendannet brok forekommer meget sjældent hos børn.

Efter operationen

Barnet kan udskrives, når det er helt vågent og har det godt.

Barnet skal kunne gå selv, have tisset og ikke have kvalme eller smerter.

Hjemme

I skal selv sørge for transport hjem fra hospitalet. Der skal være en ansvarlig voksen til stede i hjemmet det første døgn af hensyn til barnets sikkerhed.

Smerter

Efter operationen gives smertestillende medicin efter behov.

Skulle det gøre lidt ondt i såret de første dage, er håndkøbs-medicin oftest nok.

Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille. Hvis barnet får tiltagende ondt i såret, hævelse eller feber, tyder det på betændelse. Så skal I henvende Jer til vagtlægen eller egen læge. Der kan komme blodudtrædning omkring såret, men den forsvinder af sig selv.

I forbindelse med lyskebrok kan pungen desuden blive hævet og misfarvet. Dette er ufarligt og vil forsvinde af sig selv igen.

De første dage

Barnet må spise og drikke som vanligt. Undgå boldspil og voldsom leg den første uges tid. Der er ingen grund til at begrænse barnets sædvanlige aktiviteter.

Barnet må brusebade dagen efter operationen. Karbad, havbad eller svømmehal frarådes de første 10 dage efter operationen.

Plastret kan fjernes 24 timer efter operationen.

Trådfjernelse

Såret er syet med tråd, der forsvinder af sig selv. Der kan være tråddender, der, hvis de generer, kan fjernes hos egen læge efter 7-10 dage.

Med venlig hilsen

Personalet på Dagkirurgisk afsnit