

Evt. spørgsmål til sygeplejersken / lægen:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Hillerød Hospital**  
Anæstesiologisk Afd.  
Dagkirurgisk afsnit 0162  
Dyrehavevej 29  
3400 Hillerød

Telefon: 48 29 49 00  
Træffetid: 09.00 - 12.00  
14.00 - 15.00



**Hillerød Hospital**  
**Anæstesiologisk Afdeling**  
**Dagkirurgisk afsnit 0162**

# Manglende nedsynkning af testikler hos børn

- Du skal møde på Dagkirurgisk Afsnit 0162 dato: \_\_\_\_\_
- Du bedes ringe **hverdagen inden** operationen, mellem kl. 13 og 14, på tlf.:48294905 og få oplyst mødetidspunkt.
- Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause fra dato: \_\_\_\_\_

## Bedøvelse

Der lægges en lille slange (et drop) i en åre på håndryggen eller underarmen. Der bliver sat elektroder på brystet til kontrol af hjertet, og operationen foregår i fuld bedøvelse.

Ved kvalme efter bedøvelsen, kan der gives medicin for dette.

## Operation

Ved operationen lægges et snit i lysken og et lille snit i pungen. Testiklen føres ned i pungen, hvor den sys fast.

## Efter operationen

Drengen kan udskrives, når han er helt vågen og har det godt. Han skal kunne gå selv, have tisset og ikke have kvalme eller smerter.

## Hjemme

I skal selv sørge for transport hjem fra hospitalet. Der skal være en ansvarlig voksen til stede i hjemmet det første døgn af hensyn til hans sikkerhed.

## Smerter

Efter operationen gives smertestillende medicin efter behov. Skulle det gøre lidt ondt i såret de første dage, er håndkøbs-medicin oftest nok.

## Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille. Hvis drengen får tiltagende ondt i såret, hævelse, rødme eller feber, kan det være tegn på betændelse. I så fald skal I henvende jer til vagtlægen eller egen læge. Der kan komme blodudtrædning omkring såret, men den forsvinder af sig selv.

Pungen kan desuden blive hævet og misfarvet. Det er ufarligt og vil forsvinde af sig selv.

## De første dage

Mad og drikke som vanligt. Undgå boldspil og voldsom leg den første uges tid.

Karbad, havbad eller svømmehal frarådes de første 10 dage efter operationen.

Plastret kan fjernes dagen efter operationen.

## Trådfjernelse

Såret er syet med tråd, der forsvinder af sig selv. Der kan være trådender, der - hvis de generer - kan fjernes hos egen læge efter 7-10 dage.

Med venlig hilsen  
Personalet på Dagkirurgisk afsnit