



# Dit barn skal bedøves

- information til forældre



## Inden bedøvelsen

Før dit barn skal opereres, skal I tale med en anæstesi-læge (narkoselæge) om bedøvelsen. Anæstesi-lægen læser barnets journal og spørger om ting, der har betydning for bedøvelsen.

Under samtalen fortæller anæstesi-lægen om faste-regler, lokalbedøvende EMLA-creme (tryllecreme) og bedøvelsen. Specielt fortælles om indledningen af bedøvelse og de muligheder der er - oftest indledning via et stik (et drop) på håndryggen eller med en maske for ansigtet.

## Faste

For at forebygge opkastning i forbindelse med bedøvelse er det vigtigt, at mavesækken er tom. Dit barn må derfor ikke spise, drikke, tygge tyggegummi, sutte bolcher eller lignende i fasteperioden.

Dit barn må ikke spise eller få mælk/modermælkserstatning 6 timer før operationen, men må få vand, saft eller kamillete (tynde, klare væsker) indtil 2 timer før operationen.

Børn, der ammes, må få ammemælk indtil 4 timer før barnet skal bedøves og skal herefter faste.

## Operationsdagen

Når tidspunktet for operationen nærmer sig, får dit barn evt. tryllecreme på håndrygge eller albuebøjninger. Såfremt I får tryllecreme med hjem, bliver I informeret om brugen af denne.

Én eller begge forældre følger barnet til operationsstuen, og her må begge forældre gå med ind på operationsstuen, til barnet sover. Forældre, der følger med ind på operationsstuen, får en overtrækskittel og hue på.

Barnet kan beholde sit eget *rene* undertøj, T-shirt eller nattøj på og må gerne tage sovedyr med.

**OBS:** Tøjet kan evt. misfarves af desinfektionsmidler eller andet.

## På Operationsafdelingen

Her modtages I af personalet fra Anæstesi- og Operationsafdelingen.

Før bedøvelsen indledes, kontrollerer personalet dit barns navn og CPR-nummer samt, hvad barnet skal opereres for.

## Bedøvelsen

På operationsstuen sættes en lysende klemme - som måler ilt-indholdet i blodet - på en finger, klistermærker på brystkassen til overvågning af dit barns hjerte samt en blodtryksmanchet på armen.

Bedøvelsen indledes på én af følgende måder:

- a) via drop på håndryg
- b) via maske

Den aftalte indledningsform kan i visse situationer – og ved behov - ændres.

Når barnet sover, skal forældre gå tilbage til sengeafdelingen.

## Efter operationen

Når operationen er slut, tager det tid at vække barnet. Barnet vækkes på operationsstuen. En anæstesisygeplejerske følger dit barn til opvågningsafsnittet / sengeafsnittet.

Hvis dit barn kommer på opvågningsafsnittet, ringes til afdelingen, så du / I får mulighed for at være hos barnet under opvågningen.

Personalet fra opvågningsafsnittet følger dit barn i denne periode bl.a. for at sikre en tilfredsstillende smertebehandling.

Dit barn flyttes tilbage til sengeafdelingen, når påvirkningen af anæstesimidlerne er aftaget, og dit barn er smertebehandlet.