

Evt. spørgsmål til sygeplejersken / lægen:

---

---

---

---

---

---

---

---

**Hillerød Hospital**  
Anæstesiologisk Afd.  
Dagkirurgisk afsnit 0162  
Dyrehavevej 29  
3400 Hillerød

Telefon: 48 29 49 00  
Træffetid: 09.00 - 12.00  
14.00 - 15.00



**Hillerød Hospital**  
**Anæstesiologisk Afdeling**  
**Dagkirurgisk afsnit 0162**

# Forhudsforrånævring hos børn

- Du skal møde på Dagkirurgisk Afsnit 0162 dato: \_\_\_\_\_
- Du bedes ringe **hverdagen inden** operationen, mellem kl. 13 og 14, på tlf.:48294905 og få oplyst mødetidspunkt.
- Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause fra dato: \_\_\_\_\_

## Bedøvelse

Der lægges en lille slange (et drop) i en åre på håndryggen eller underarmen. Der sættes elektroder på brystet til kontrol af hjertet, og operationen foregår i fuld bedøvelse.

Hvis der opstår kvalme efter bedøvelsen, kan der gives medicin for dette.

## Operation

Ved operationen korrigeres forberedelsen på forhuden.

## Efter operationen

Drengen kan udskrives, når han er helt vågen og har det godt. Han skal kunne gå selv, have tisset og ikke have kvalme eller smerter.

Inden udskrivelsen bliver han tilset af kirurgen.

## Hjemme

I skal selv sørge for transport hjem fra hospitalet. Der skal være en ansvarlig voksen til stede i hjemmet det første døgn af hensyn til barnets sikkerhed.

## Smerter

Efter operationen gives der smertestillende medicin efter behov. Skulle det gøre lidt ondt i såret de første dage, er håndkøbsmedicin oftest nok. Lidokain (lokal bedøvende creme) kan påsmøres efter behov - evt. før vandladning.

## Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille. Hvis der kommer tiltagende smerter i såret eller feber, tyder det på betændelse. Så skal I henvende Jer til vagtlægen eller egen læge.

Der kan komme hævelse eller blodudtrædning omkring såret, men den forsvinder af sig selv.

## De første dage

Mad og drikke som vanligt. Der er ingen grund til at begrænse de sædvanlige aktiviteter. Brusebad må tages dagen efter operationen.

Karbad, havbad eller svømmehal frarådes de første 10 dage efter operationen.

## Trådfjernelse

Såret er syet med tråd, der oftest forsvinder af sig selv efter 14 dage. Egen læge kan eventuelt kontrollere operationsresultatet 1 uge efter operationen.

Med venlig hilsen  
Personalet på Dagkirurgisk afsnit