

Hillerød Hospital
Anæstesiologisk Afdeling
Dagkirurgisk afsnit 0162

REGION

Fjernelse af polyp i livmoderen

- Du skal møde på Dagkirurgisk Afsnit 0162 dato: _____
- Du bedes ringe **hverdagen inden** operationen, mellem kl. 13 og 14, på tlf.:48294905 og få oplyst mødetidspunkt.
- Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause fra dato: _____

Hillerød Hospital
Anæstesiologisk Afd.
Dagkirurgisk afsnit 0162
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Telefon: 48 29 49 00
Træffetid: 09.00 - 12.00
14.00 - 15.00

Hvordan foregår indgrebet?

Man fører en lille kikkert gennem skeden ind i livmoderhulen. Polyppen eller polypperne skæres af ved roden og fjernes med en lille tang. Under indgrebet skylles med saltvand for at få overblik. Indgrebet tager 15-30 minutter og foregår normalt i fuld bedøvelse.

Hvis du har fået den fulde information om indgrebet af din speciallæge, kan du komme direkte til operation. Ønsker du en uddybende samtale på hospitalet, er du meget velkommen til det.

Hvad sker der på forundersøgelsesdagen?

Du møder på dagkirurgisk afsnit 0162, hvor du taler med sygeplejerske, læge og narkoselæge, der sikrer, at du er klar til indgrebet samt informerer dig om det videre forløb.

Medbring venligst det udfyldte skema vedrørende helbredsoplysninger.

Hvad sker der på operationsdagen?

Du møder fastende - se ”Information om Dagkirurgisk afsnit 0162”.

Hvorledes er forløbet efter operationen?

Du bliver udskrevet samme dag. Inden udskrivelsen fortæller operatøren dig om indgrebet, og I aftaler, om du skal komme til kontrol. Efter ca. 3 uger modtager du et brev med mikroskopisvar af det væv, der er taget ud.

Du bør ikke føre bil det første døgn efter operationen, og du bør ikke være alene hjemme den første nat. Efter nogle få dage, kan du genoptage dine normale aktiviteter.

Der kan være menstruationslignende smerter lige efter operationen. Disse smerter kan behandles med de samme håndkøbsmidler, som man anvender mod menstruationssmerter.

Der kan være blødning i dagene efter udskrivelsen. Så længe du har blødning eller blodigt udflåd, kan der være let øget risiko for underlivsbetændelse. Du bør derfor undlade at benytte tampon, undlade karbad, svømmehal og havbad samt benytte kondom ved samleje.

Hvis du får smerter eller blødning, som er kraftigere end ved menstruation, eller hvis du får feber, bør du kontakte din egen læge eller speciallæge.

Med venlig hilsen

Personalet på dagkirurgisk afsnit