

Hillerød Hospital  
Anæstesiologisk Afdeling

Anæstesi - Januar 2009

REGION

# Centralt Vene Kateter (CVK)

Anæstesiologisk Afdeling - Hillerød Hospital

**Hillerød Hospital**  
Anæstesiologisk Afdeling  
Dyrehavevej 29  
3400 Hillerød

Telefon - dag : 48 29 42 01



Du skal have lagt et Centralt Vene Kateter – også kaldet et CVK. Denne information supplerer den mundtlige information, du modtager af personalet.

### Hvad er et CVK?

Et CVK er en tynd plastikslange, der placeres i en af de store blodårer på halsen eller under kravebenet.

### Hvorfor skal du have CVK?

Det har ikke været muligt at anlægge et almindeligt drop på din håndryg eller din underarm.

Du skal have medicin eller ernæringsprodukter ind i blodåren, som giver irritation og betændelse, hvis det gives i de mindre blodårer.

### Hvordan lægges et CVK?

- Anlæggelsen af CVK udføres af en anæstesi-læge under lokal bedøvelse og foregår på anæstesiaafdelingen.
- Umiddelbart inden anlæggelsen desinficeres huden, hvor CVK'et skal ind, og du vil blive dækket af et sterilt klæde.
- Leje eller seng vil blive tippet, så du får hovedet lidt nedad. Denne stilling medfører, at blodåren bliver større og dermed lettere at se.
- CVK'et føres gennem huden ind i blodåren og sys fast med et par sting. – Se billede på bagsiden af folderen.
- Derefter dækkes CVK'et af en plasterforbinding.
- Det tager op til ½ time at få lagt et CVK.

### Hvilke gener er der ved at få anlagt et CVK?

De fleste synes, det er lidt ubehageligt at få lagt. Området omkring CVK'et kan være ømt.

### Hvilke risici er der ved at anlægge og have et CVK?

I forbindelse med anlæggelsen er der en minimal risiko for, at der kan gå hul på lungen, så den ”klapper sammen”. Det kan behandles med et dræn, så lungen folder sig ud igen.

Der kan opstå en blødning fra blodkarret. Blodets evne til at størkne undersøges derfor inden anlæggelsen.

Der kan opstå infektion omkring eller igennem kateteret - i givet fald gives antibiotika og kateteret fjernes.

Jo længere dit CVK ligger, jo større er risikoen for infektion.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå en blodpropdannelse inde i blodkarret – CVK'et skal så oftest fjernes og ofte gives blodfortyndende medicin.

### Hvad gør personalet?

Personalet vil holde øje med risikomomenterne og vil håndtere CVK'et, så risikoen for infektion mindskes mest muligt.

### Hvad kan du gøre?

Du skal fortælle personalet, hvis du efter anlæggelsen får smerter ved vejrtrækning eller åndenød.

Du skal gøre personalet opmærksom på, at dit CVK skal fjernes, hvis det ikke benyttes mere.

Du skal også give personalet besked, hvis du synes, noget ikke er, som det burde være. Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om.

### Når CVK'et skal fjernes

Et CVK kan fjernes af en sygeplejerske på afdelingen. Du skal ligge ned, når det fjernes – det gør ikke ondt og efterlader et lille hul, som dækkes med et plaster. Plastret kan fjernes efter et døgn, når hullet har lukket sig.